A blue-tinted, semi-transparent human skeleton is centered in the background of the page. The skeleton is shown from the front, with the skull, ribcage, spine, pelvis, and leg bones clearly visible. The background is a dark blue gradient with faint, larger-scale anatomical diagrams and a starry space-like pattern.

M SEMANA
HIIT

Preventiva

PREVENTIVA

Preventiva

→ Indicadores em Saúde:

- “Medida-síntese que contém informação a respeito de determinados atributos e dimensões relativos a eventos de interesse para saúde”;
- É uma ferramenta para interpretar um fenômeno de interesse, como uma doença, que esteja acometendo uma região;
- Características de um Indicador:
 - Propriedades dos componentes utilizados;
 - Precisão dos sistemas de informação;
 - Validade;
 - Confiabilidade;
 - Mensurabilidade;
 - Relevância;
 - Custo-efetividade.

→ Prevalência:

- Numerador:
 - Casos existentes (novos e velhos).
- Denominador:
 - População exposta.
- Objeto de estudo:
 - Presença ou ausência de doença.
- Utilização:
 - Estima a probabilidade de a população estar doente no período de tempo determinado;
 - Mais úteis em estudos que visam delimitar a carga de doenças crônicas em uma população e suas implicações para os serviços de saúde.
- Número de casos existentes / População exposta.

→ Incidência:

- Numerador:
 - Casos novos durante um período específico de tempo.
- Denominador:
 - População em risco.
- Objeto de estudo:
 - Se evento é um novo caso;
 - Tempo de doença.

○ Utilização:

- Risco de tornar-se doente;
- Principal medida para doenças ou condições agudas, mas pode também ser utilizada para doenças crônicas;
- Mais útil em estudos de causalidade.

○ Número de casos novos / População em risco

→ Relação Incidência e Prevalência:

- Prevalência $\cong$ Incidência x Duração média da doença
- Durante Endemias/Pandemias:
 - Contagem do número absoluto pode ser utilizado para dar magnitude ao problema de saúde ou de sua tendência em curto prazo, em uma população;
 - Taxa de ataque:
 - Utilizada no lugar de incidência durante uma epidemia em uma população bem definida em um curto período de tempo.
 - Número de pessoas afetadas / Número de pessoas expostas.
- Taxa de Prevalência:
 - $P = (\text{Número de pessoas com doença} / \text{População exposta}) \times 1000$
 - Multiplicamos por 1000 para termos um denominador comum e fazermos melhores comparações entre regiões, tendo como base a prevalência de determinada doença por 1000 pessoas.
 - Sem levar em conta idade das pessoas acometidas, os principais fatores que determinam taxa de prevalência são:
 - Severidade da doença;
 - Duração da doença;
 - Número de casos novos.
- Fatores que Aumentam as Taxas de Prevalência:
 - Maior duração da doença;
 - Aumento da sobrevivência do paciente, mesmo sem a cura da doença;
 - Aumento de novos casos;

- Imigração de casos;
- Emigração de pessoas saudias;
- Melhora dos recursos diagnósticos.
- Fatores que Diminuem as Taxas de Prevalência:
 - Menor duração da doença;
 - Maior letalidade da doença;
 - Redução de novos casos;
 - Imigração de pessoas saudias;
 - Emigração de casos;
 - Aumento da taxa de cura da doença.
- Taxa de Densidade de Incidência:
 - $I = (\text{Número de pessoas que adoecem no período} / \text{Pessoa-tempo em risco}) \times 1000$
 - A maneira mais precisa de calcular a incidência seria pela taxa de incidência pessoa-tempo em risco;
 - Para cada ano de observação, e até que a pessoa desenvolva a doença ou seja perdido o acompanhamento, cada pessoas da população em um estudo contribui com uma pessoa-ano (ou dia, semana, mês) no denominador.

- Refere-se à probabilidade de um indivíduo da população vir a desenvolver a doença durante um período específico de tempo;
- É adequada para divulgar informações em saúde para o público em geral.

Figura 2.3. Exemplo de cálculo de medidas de ocorrência de doenças

- Taxa de Incidência Cumulativa = $(3 \text{ pessoas infectadas} / 7 \text{ pessoas}) \times 100$

○ Letalidade:

- $(\text{Número de mortes de uma determinada doença em certo período} / \text{Número de casos desta determinada doença no mesmo período}) \times 100$
- Mede a severidade de uma doença;
- Proporção de mortes dentre aqueles doentes por uma causa específica em um certo período de tempo.

➔ Indicadores e índices de Mortalidade:

○ Indicador vs Índice:

- Indicador: retrata apenas um aspecto, como natalidade ou mortalidade;
- Índice: expressa uma situação complexa em uma medida, como o IDH.

○ Taxa Bruta de Mortalidade:

- $(\text{N}^\circ \text{ de óbitos durante o ano} / \text{População total nesse ano}) \times 1000$
- Taxa bruta:
 - Indicador mais realista;
 - Identifica necessidades e mede suas importâncias;

Figura 2.3. Exemplo de cálculo de medidas de ocorrência de doenças

- Taxa de Densidade de Incidência = $(3 \text{ pessoas infectadas} / 30 \text{ pessoas/ano}) \times 100$
- Taxa de Incidência Cumulativa:
 - $I = (\text{Número de pessoas que adoeceram no período} / \text{Número de pessoas sem a doença no início do período}) \times 1000$
 - Maneira mais simples de mediar a ocorrência de uma doença;

- Leva em consideração características sociodemográficas.
- Coeficiente de Mortalidade Específica por Idade:
 - (Nº de óbitos em determinada faixa etária durante o ano / População em determinada faixa etária nesse período) x 1000
- Taxa de Mortalidade Proporcional:
 - (Nº de óbitos devido a esta causa durante o ano / Total de óbitos nesse período) x 1000
 - Não expressa o risco dos membros de uma população contrair ou morrer por uma doença.
- Curvas de Mortalidade Proporcional:
 - Permitem avaliar o nível de saúde da região estudada:
 - Grupos etários estudados:
 - < 1 ano;
 - 1-4 anos;
 - 5-19 anos;
 - 20 a 49 anos;
 - > 50 anos.

Tipo I

Figura 3 – Variações da curva de mortalidade proporcional
Fonte: Laurenti et al, 1985.

- Predomínio de óbitos em adultos jovens;
- Nível de saúde muito baixo.

Tipo II

Figura 3 – Variações da curva de mortalidade proporcional
Fonte: Laurenti et al, 1985.

- Predomínio de óbitos infantil e pré-escolar;
- Nível de saúde baixo.

Tipo III

Figura 3 – Variações da curva de mortalidade proporcional
Fonte: Laurenti et al, 1985.

- Predomínio de óbitos em 50 ou mais, porém com nível de mortalidade infantil alto;
- Nível de saúde regular.

Figura 3 – Variações da curva de mortalidade proporcional
Fonte: Laurenti et al, 1985.

- Predomínio de óbitos em 50 ou mais;
 - Nível de saúde alto.
- Índice de Swaroop-Uemura ou Razão Proporcional por Idade:
 - $(N^{\circ} \text{ de } \acute{o}b\text{itos } \geq 50 \text{ anos} / \text{Total de } \acute{o}b\text{itos nesse per}\acute{o}d\text{o}) \times 1000$
 - $RMP \geq 75\% \rightarrow$ padrão típico de país desenvolvido;
 - Com o aumento da expectativa de vida, tem sido considerado a proporção de óbitos ≥ 75 anos.
 - Taxa de Letalidade:
 - $(N^{\circ} \text{ de } \acute{o}b\text{itos por determinada enfermidade durante um per}\acute{o}d\text{o de tempo} / N^{\circ} \text{ de casos desta enfermidade neste per}\acute{o}d\text{o de tempo}) \times 100$
 - Taxa de Mortalidade Materna:
 - É um indicador sensível de saúde para a região;
 - $(N^{\circ} \text{ de } \acute{o}b\text{itos do sexo feminino por causas maternas} / N^{\circ} \text{ de nascidos vivos neste ano}) \times 100.000$
 - Definição da OMS de Morte Materna:
 - “Morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após seu término, independentemente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais”.
 - Taxa de Mortalidade Infantil:
 - Assim como a taxa de mortalidade materna, essa é também uma taxa sensível para estudar uma região;
 - $(N^{\circ} \text{ de } \acute{o}b\text{itos menores de 1 ano de idade durante o ano} / N^{\circ} \text{ de nascidos vivos durante o ano}) \times 1000$
 - Costuma-se classificar o valor da taxa como:
 - Alta = > 50 óbitos / 1000 nascidos vivos;
 - Média = 20-49 óbitos / 1000 nascidos vivos;
 - Baixa = < 20 óbitos / 1000 nascidos vivos.
 - Apresenta dois componentes:
 - Taxa de mortalidade neonatal;
 - Taxa de mortalidade Neonatal.
 - Taxa de Mortalidade Neonatal:
 - $(N^{\circ} \text{ de } \acute{o}b\text{itos com 0 a 27 dias de idade durante o ano} / N^{\circ} \text{ de nascidos vivos durante o ano}) \times 1000$
 - Influenciada por:
 - Condições da gestação;
 - Acesso e qualidade da assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
 - Associada a:
 - Causas perinatais;
 - Anomalias congênitas.
 - Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce:
 - $(N^{\circ} \text{ de } \acute{o}b\text{itos com 0 a 6 dias de idade durante o ano} / N^{\circ} \text{ de nascidos vivos durante o ano}) \times 1000$
 - É a que mais contribui dentro da mortalidade infantil.
 - Taxa de Mortalidade Neonatal Tardia:
 - $(N^{\circ} \text{ de } \acute{o}b\text{itos com 7 a 27 dias de idade durante o ano} / N^{\circ} \text{ de nascidos vivos durante o ano}) \times 1000$
 - Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal:
 - $(N^{\circ} \text{ de } \acute{o}b\text{itos com 28 a 364 dias de idade durante o ano} / N^{\circ} \text{ de nascidos vivos durante o ano}) \times 1000$
 - Influenciada por:
 - Condições de vida e características familiares;
 - Associada a:

- Doenças infectocontagiosas e parasitárias.
- Taxa de Mortalidade Perinatal:
 - $(N^{\circ} \text{ de natimortos} + n^{\circ} \text{ de \u00f3bitos de 0 a 6 dias de idade} / N^{\circ} \text{ de nascidos vivos} + N^{\circ} \text{ de natimortos}) \times 1000$
 - Per\u00edodo perinatal:
 - Come\u00e7a em 22 semanas completas de gesta\u00e7\u00e3o e termina aos 7 dias completos ap\u00f3s o nascimento.
- ➔ Indicadores Demogr\u00e1ficos:
 - Taxa Bruta de Natalidade:
 - $(N^{\circ} \text{ total de nascidos vivos residentes} / \text{Popula\u00e7\u00e3o total residente}) \times 1000$
 - Taxa de Fecundidade Espec\u00edfica:
 - $(N^{\circ} \text{ de filhos nascidos vivos de mais residentes de determinada faixa et\u00e1ria} / \text{Popula\u00e7\u00e3o total feminina residente, desta mesma faixa et\u00e1ria})$
 - Taxa e Fecundidade Total:
 - Somat\u00f3rio das Taxas de Fecundidade Espec\u00edficas.
 - Importante sobre Indicadores Demogr\u00e1ficos:
 - Taxa de fecundidade trabalha com popula\u00e7\u00e3o de mulheres de 15 a 49 anos de idade;
 - Taxa de fecundidade total < 2,1 ➔ insuficiente para reposi\u00e7\u00e3o populacional:
 - N\u00e3o se usa uma taxa de 2,0 porque isso ignoraria as taxas de mortalidade que atingem as pessoas antes da idade reprodutiva.
- ➔ Perfil Demogr\u00e1fico e Brasileiro:
 - N\u00famero de habitantes: 211 mi (2019);
 - Expectativa de vida ao nascimento: 75,6 anos (2018):
 - 71,9 para homens e 79,2 para mulheres.
 - Taxa de fecundidade total: 1,7 (2018);
 - Taxa de urbaniza\u00e7\u00e3o: 86,8% (2020);
 - Gasto anual da Uni\u00e3o em sa\u00fade per capita (2020): 1.398,53 d\u00f3lares.
 - Tend\u00eancias do Perfil Demogr\u00e1fico:
 - Redu\u00e7\u00e3o da taxa de fecundidade;
 - Redu\u00e7\u00e3o da taxa de natalidade;
 - Envelhecimento populacional;
 - Diminui\u00e7\u00e3o do ritmo de crescimento populacional.

Dados: DATASUS (2019). Acessado em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.def>

Dados: DATASUS (2019). Acessado em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.def>

Dados: DATASUS (2019). Acessado em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.def>

○ Distribuição da Incidência de Câncer na população Masculina:

Localização Primária	Casos	%	
Próstata	65.840	29,2%	Homens
Cólon e reto	20.520	9,1%	
Traqueia, brônquio e pulmão	17.760	7,9%	
Estômago	13.360	5,9%	
Cavidade oral	11.180	5,0%	
Esôfago	8.690	3,9%	
Bexiga	7.590	3,4%	
Linfoma não Hodgkin	6.580	2,9%	
Laringe	6.470	2,9%	
Leucemias	5.920	2,6%	

Fonte: INCA (2019). Acessado em <<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf>>

○ Distribuição da Incidência de Câncer na população Feminina:

	Localização Primária	Casos	%
Mulheres	Mama feminina	66.280	29,7%
	Cólon e reto	20.470	9,2%
	Colo do útero	16.590	7,4%
	Traqueia, brônquio e pulmão	12.440	5,6%
	Glândula tireoide	11.950	5,4%
	Estômago	7.870	3,5%
	Ovário	6.650	3,0%
	Corpo do útero	6.540	2,9%
	Linfoma não Hodgkin	5.450	2,4%
	Sistema nervoso central	5.220	2,3%

Fonte: INCA (2019). Acessado em <<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf>>

○ Padrão no Perfil de Mortalidade:

- Nesse gráfico a gente acompanha a variação de algumas doenças no Brasil.
- Transições:
 - Epidemiológica:
 - Redução na proporção de doenças infecto-parasitárias e aumento na proporção de óbitos por doenças circulatórias e neoplasias.
 - Demográfica:
 - Queda da fecundidade e envelhecimento populacional.
- Tripla Carga de Doença:
 - Um sistema de saúde voltado a atender condições agudas não apresenta estruturas para responder, com eficiência, efetividade e qualidade, condições crônicas.
 - Tripla carga:
 - Infecções / desnutrição / problemas de saúde reprodutiva;
 - Condições crônicas não transmissíveis;
 - Causas externas (principalmente violência e acidentes de trânsito).

Questões

1) (ESPECIALISTA EM SAÚDE I - MÉDICO SANITARISTA - PREF. CUBATÃO/SP - VUNESP -2012)

São indicadores de saúde:

- I – Aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um grupo populacional. Exemplo: a razão de mortalidade proporcional;
- II – Aqueles que se referem às condições do meio e que têm influência sobre a saúde. Exemplo: saneamento básico;
- III – Aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos relacionados às atividades de saúde. Exemplo: número de unidades básicas de saúde.

Está correto o contido em:

- A- I, apenas.
- B- II, apenas.
- C- I e II, apenas.
- D- II e III, apenas.
- E- I, II e III.

- 2) (PREF. DE FLORIANÓPOLIS — FEPESE – 2008) A atenção primária à saúde no Brasil aproximou os serviços de saúde das comunidades. Muitos foram os que tiveram o diagnóstico precoce e a instituição do benefício de tratamentos, como o uso de hipoglicemiantes em diabetes. O aumento da sobrevida, proporcionado pelo tratamento, deverá:
- A- Diminuir a incidência da doença.
 - B- Diminuir a prevalência da doença.
 - C- Aumentar a incidência da doença.
 - D- Aumentar a prevalência da doença.
 - E- Não alterar nenhuma das duas.

3) (MÉDICO – CIRURGIA GERAL – UNIMED/ BH – GESTÃO DE CONCURSOS – 2015

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa CORRETA.

- A- É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1000).
- B- É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1000.)
- C- É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D- É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

4) MÉDICO SANITARISTA PSF 20H – PREF. DUQUE DE CAXIAS/RJ – IDECAN 2014.

Com relação à transição epidemiológica é INCORRETO afirmar que:

- A- Muda o padrão de morbimortalidade para grupos mais idosos.
- B- Substitui doenças não transmissíveis por transmissíveis e causas externas.
- C- O Brasil, diferentemente de países industrializados, experimenta uma transição epidemiológica diferenciada, a contra-transição, devido ao fato de coexistirem predominantemente doenças crônicas e infecciosas. Dessas, algumas se reintroduzem (dengue, cólera), outras recrudescem (hanseníase).
- D- Tem relação com transformações sociodemográficas e econômicas.

Gabarito

- 1- E
- 2- D
- 3- B
- 4- B